Box size: 2.27 x 5.31 Overall Size: 18 x 21 Folds to: 2.25 x 4.2

COVIDIEN™

Biosyn™

Monofilament Synthetic Absorbable Suture

PT00156179

(01)10884521156179

en

BEFORE USING PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

DESCRIPTION

Biosyn™ is a sterile, non-pyrogenic braided suture (Biosyn™ suture) consisting of 95% glycolide and 5% L-lactide, coated with glycolide, caprolactone, calcium stearate and polyethylene glycol. Biosyn™ sutures are not lubricated, dyed and coated.

Qualitative and Quantitative Data	
Glycolide monomer, residual amount, calculated as glycolic acid	0.00150 g
Monomer, maximum allowed, calculated as glycolic acid	0.00000150 g

Maximum amounts per sterilized suture in accordance with Ph. Eur. 2.9.32 for non-dyed sutures, e.g. size 2.

Bacteriostatic properties are not of Biosyn™ sutures. Indicated for use in soft tissues, including muscle, in general surgery, gynaecology, paediatric surgery, orthopaedics, ENT, oral surgery, dermatology, plastic surgery, cardiovascular surgery, cardiac surgery, thoracic surgery, neurosurgery, urology, veterinary medicine. Before use, ensure that the sterile barrier is intact. Use only if the sterile barrier is intact. Biosyn™ sutures are not absorbable in vivo. Biosyn™ sutures are not absorbable in vitro.

Biosyn™ sutures are not absorbable in vitro. Biosyn™ sutures are not absorbable in vitro. Biosyn™ sutures are not absorbable in vitro.

5. Κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων ενδοκοιλίας, κάνετε τομές στο μικρότερο δυνατό μέγεθος. Αποφύγετε τις τομές στο κέντρο.
6. Μη χρησιμοποιείτε λαβίδες τύπου «ασφάλειας» κατά τη χρήση μη αιμοστατικών συνδετικών δακτυλίων. Γάντια χειρουργικής.
7. Τοποθετήστε τις μη αιμοστατικές λαβίδες κάτω από τον δακτύλιο μόνο μετά τη λήψη μιας σωστής θέσης κοντά στο τοίχωμα του αγγείου.
8. Μη χρησιμοποιείτε μη αιμοστατικές λαβίδες σε περιοχές με πολλά αγγεία.
9. Μη χρησιμοποιείτε μη αιμοστατικές λαβίδες σε ασθενείς με αιμορραγικές διαταραχές.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Ο Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Ο ρόλος του ενδοκοιλιακού αποστείρωσης στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 1-5.
2. Πάτρας Ι., Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Χειρουργική θεραπεία νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 6-10.
3. Τσιρόπουλος Δ., Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 11-15.
4. Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 16-20.
5. Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 21-25.
6. Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 26-30.
7. Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 31-35.
8. Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 36-40.
9. Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 41-45.
10. Μακρίδης Δ., Φωκάς Κ., Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση στη χειρουργική θεραπεία της νεκρωτικής παγκρεατίτιδας. Ελληνικά Χειρουργικά Χρονικά 2000; 4(1): 46-50.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Κρατήστε μακριά από τα παιδιά. Μόνο ιατρική χρήση.
2. Μη χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει υποστεί βλάβη ή αν φαίνεται ότι η αποστείρωση έχει παραβιαστεί.
3. Μη χρησιμοποιείτε μετά τη λήξη της ημερομηνίας χρήσης.
4. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
5. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
6. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
7. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
8. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
9. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Κρατήστε τη συσκευασία κλειστή μέχρι τη στιγμή χρήσης.
2. Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία παρουσιάζει ζημιά ή εάν φαίνεται ότι η αποστείρωση έχει παραβιαστεί.
3. Μη χρησιμοποιείτε μετά τη λήξη της ημερομηνίας χρήσης.
4. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
5. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
6. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
7. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
8. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
9. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

1. Κατά τη διάρκεια χειρουργικής, δεν χρειάζεται η χρήση αντιβιοτικών.
2. Η χειρουργική θεραπεία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αιμορραγία.

ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια χειρουργικής, δεν χρειάζεται η χρήση αντιβιοτικών. Η χειρουργική θεραπεία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αιμορραγία. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε περιοχές με πολλά αγγεία. Μην χρησιμοποιείτε τα εργαλεία σε ασθενείς με αιμορραγία.
2. Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία παρουσιάζει ζημιά ή εάν φαίνεται ότι η αποστείρωση έχει παραβιαστεί.
3. Μη χρησιμοποιείτε μετά τη λήξη της ημερομηνίας χρήσης.
4. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
5. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
6. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
7. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
8. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.
9. Μη χρησιμοποιείτε εάν η αποστείρωση δεν πραγματοποιήθηκε μετά τη λήξη.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ / ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΗ

Η χειρουργική θεραπεία πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αιμορραγία.

Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αιμορραγία.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Η χειρουργική θεραπεία πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αιμορραγία. Η ενδοκοιλιακή αποστείρωση πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αιμορραγία.